



تب در کودکان بالای 5 سال



این توصیه برای والدین یا مراقبانی است که پس از مشورت با پزشک، فرزند خود را به خانه می برند. پزشک ممکن است بسته به شرایط کودک شما درمان های مختلفی را توصیه کند.

تب در کودکان بالای 5 سال

این توصیه برای والدین و مراقبان کودکان بالای 5 سال است که تب دارند و ممکن است علت آن را ندانیم.

درباره تب در کودکان

- اگر دمای کودک شما 38 درجه سانتیگراد یا بیشتر باشد، تب دارد.
- تب در کودکان شایع است و نشان می دهد که کودک شما ممکن است عفونت داشته باشد.
- اکثر کودکان مبتلا به تب خیلی سریع خوب می شوند، اما برخی از کودکان ممکن است بدتر شوند. شما باید به طور مرتب کودک خود را در طول روز و در طول شب چک کنید و توصیه های زیر را دنبال کنید.

علت تب در کودکان چیست؟

- شایع ترین دلیل تب فرزند شما عفونت ویروسی است. عفونت های ویروسی معمولاً خود به خود بهبود می یابند و نیازی به درمان ندارند.
- برخی از تب ها به دلیل عفونت های باکتریایی ایجاد می شوند. برای درمان عفونت های باکتریایی می توان به آنتی بیوتیک ها نیاز داشت.
- تب همچنین می تواند تا 48 ساعت پس از برخی ایمن سازی های دوران کودکی شایع باشد.
- تب گاهی می تواند به دلیل یک اختلال التهابی باشد و ناشی از عفونت نباشد.

چگونه می توانم از فرزندم مراقبت کنم؟

- دادن مایعات (نوشیدنی) به کودکان بسیار مهم است.
- اگر کودک شما بیمار است، بیشتر اوقات به او نوشیدنی های کوچک بدهید زیرا احتمال پایین ماندن تب بیشتر است. اگر غذا نمی خورند، مطمئن شوید که به آنها نوشیدنی های شیرین ارائه می دهید.
- مراقب علائم کم آبی فرزندتان باشید. بخش کهربایی جدول زیر "چه زمانی باید کمک بگیرم" را برای علائم کم آبی در کودک خود ببینید.
- برای دریافت مشاوره پزشکی با پزشک عمومی خود تماس بگیرید یا با NHS 24 تماس بگیرید.
- کودک خود را با لباس یا پتو نپوشانید.
- فرزند شما در حالی که تب دارد نباید به مدرسه برود. همچنین باید به مدرسه یا مهد کودک خود در مورد تب فرزندتان اطلاع دهید.
- سعی نکنید تب کودکان را با اسفنج ولرم (خنک) یا پنکه پایین بیاورید.

از کدام داروها می توانم استفاده کنم؟

- اگر کودک شما از تب ناراحت است، می توانید به او پاراستامول (کالپول) یا ایبوپروفن بدهید. هر بار یک دارو بدهید.
- اگر کودک شما بعد از 2 تا 3 ساعت بهبود نیافته است، می توانید داروی دیگری را تجویز کنید.
- برخی از کودکان نباید ایبوپروفن مصرف کنند، به عنوان مثال، کودکان مبتلا به آبله مرغان. اگر نمی دانید باید به کودک خود ایبوپروفن بدهید یا خیر، از پزشک خود بپرسید.
- دستورالعمل های روی بطری دارو را دنبال کنید تا بدانید چه مقدار و چند وقت یکبار مصرف کنید.
- اگر کودک شما بیش از حد دارو مصرف کرده است یا آن را به دفعات مصرف می کند، می تواند مضر باشد.
- اگر فکر می کنید فرزندتان بیش از حد دارو مصرف کرده است، با NHS 24 تماس بگیرید.
- به نوزادان زیر سه ماه پاراستامول یا ایبوپروفن ندهید مگر اینکه پزشک به شما گفته باشد.
- اگر در مورد داروها برای فرزندتان به کمک و راهنمایی بیشتری نیاز دارید، از داروساز محلی خود بپرسید.

تب چقدر می تواند طول بکشد؟

- اکثر تب های ناشی از عفونت ویروسی پس از 2-3 روز بهبود می یابند. علائم باید به تدریج بهبود یابد
- با این حال، مدت زمان تب به عامل ایجاد تب بستگی دارد
- اگر کودک شما بیش از 5 روز تب روزانه دارد، یا بعد از بهبود اولیه شروع به بدتر شدن کرد، باید با پزشک خود صحبت کنید.

چه زمانی باید کمک بگیریم؟

از این جدول برای کمک به شما استفاده کنید تا بدانید در صورت ناخوشی کودک چه کاری باید انجام دهید

	<p>اگر کودک شما یکی از این علائم را دارد:</p> <ul style="list-style-type: none"> • پوست رنگ پریده، خالدار (لکه دار) است یا در لمس احساس سردی می کند • دارای لب های آبی است • آیا نفس کشیدن برای شما بسیار سخت است - برای صحبت کردن، خوردن یا نوشیدن بیش از حد تنگ است • گرفتگی یا تشنج دارد • گیج است، به سختی بیدار می شود یا نمی تواند بیدار بماند • دارای بثوراتی است که با فشار دادن آن از بین نمی رود (به «تست شیشه» در زیر مراجعه کنید) • سردرد شدیدی دارد که از بین نمی رود، سفتی گردن (نمی خواهد گردن یا سر خود را تکان دهد) و یا نمی خواهد در اتاقی با چراغ روشن باشد، 	<p>اکنون به کمک نیاز دارید. به نزدیکترین بخش اورژانس بیمارستان بروید یا با شماره 999 تماس بگیرید</p>
	<p>اگر کودک شما یکی از این علائم را دارد:</p> <ul style="list-style-type: none"> • آیا نفس کشیدن برایتان مشکل است • دارای علائم کم آبی بدن از جمله: گودی چشم، خشکی دهان، عدم اشک در هنگام گریه یا ادرار نکردن (بیریزش) به مدت 12 ساعت. • دارای تورم بازو یا پا یا مفصل است • ایستادن به تنهایی را بسیار دردناک می داند • خواب آلود است (خیلی خواب آلود) یا تحریک پذیر است - به ویژه اگر کودک شما پس از فروکش کردن تب هنوز اینگونه است. • زیاد میلرزد یا درد عضلانی دارد. • بیش از 5 روز تب 38.0 درجه سانتیگراد یا بالاتر داشته باشد • به نظر می رسد در حال بدتر شدن است یا نگران هستید 	<p>باید امروز با یک پزشک یا پرستار صحبت کنید با جراحی عمومی خود یا NHS 24 تماس بگیرید - 111 را شماره گیری کنید</p>
	<p>اگر فرزند شما هیچ یک از علائم بالا را ندارد.</p>	<p>خودمراقبتی شما می توانید به مراقبت از کودک خود در خانه ادامه دهید. اگر هنوز نگران هستید با NHS 24 تماس بگیرید - 111 را شماره گیری کنید.</p>

راش و تب - تست شیشه ای



عکس و "تست شیشه ای" توسط بنیاد تحقیقات مننژیت 2013

اطلاعات از بنیاد تحقیقات مننژیت

[rash-meningitis-the-is-https://www.meningitis.org/blogs/what](https://www.meningitis.org/blogs/what-rash-meningitis-the-is)

بسیاری از مردم با به اصطلاح "تست لیوان" یا "تست شیشه ای" آشنا هستند که به موجب آن یک شیشه یا سطح شفاف دیگری بر روی بثورات فشار داده می شود. اگر با فشار دادن ناپدید شود، به عنوان راش سفید کننده شناخته می شود. "بثورات" مننژیت می تواند به عنوان یک راش سفید کننده شروع شود، اما تقریباً همیشه به یک راش پتشیال قرمز، بنفش یا قهوه ای غیر سفید کننده یا پورپورا تبدیل می شود، به این معنی که با فشار دادن ناپدید نمی شود

بازبینی: آوریل 2024. تاریخ بازبینی مارس 2024